

1. Множества. Подмножества. Способы задания множеств

Пример 1. Представить множество четных делителей числа 100 в описательной форме и путем полного перечисления элементов.

Решение. Для выделения подмножества A множества S можно использовать какое-либо свойство Φ , присущее элементам множества A и только им: характеристическое свойство элементов множества A . В этом случае пишут $A = \{x \in S \mid \Phi\}$. Такой способ задания множества называют описательным.

Как известно, любое четное число имеет вид $2k$, $k = 1, 2, \dots$, а тот факт, что какое-либо число $2k$ является делителем числа 100, означает, что отношение $\frac{100}{2k} = \frac{50}{k}$ есть натуральное число. Отсюда имеем искомое множество, представленное в описательной форме:

$$A = \left\{ 2k \in R \mid \frac{50}{k} \in N, k \in N \right\},$$

где R – множество действительных чисел, N – множество натуральных чисел.

Так как $100 = 2^2 \cdot 5^2$, то легко перечислить все элементы искомого множества: $A = \{2, 4, 10, 20, 50, 100\}$.

Пример 2. Даны множества

$$A = \{1, 3, 5, 7\}, B = \{3, 5\}, C = \{2\}, D = \{5, 7, 9\}, K = \{1, 3, 7\}.$$

Указать среди следующих утверждений истинные и ложные:

$$B \subset A, B \in A, \emptyset \subset B, D \not\subset A, \emptyset \in B, B \subset C, K \not\subset A,$$

$\emptyset$ – собственное подмножество множества A ,
 $\{5, 7, 9\}$ – собственное подмножество множества D , K – собст-

венное подмножество множества A .

Решение. По определению, если каждый элемент множества A является элементом множества B , то множество A называется подмножеством множества B . При этом пишут $A \subset B$ или $B \supset A$. Если множество A не является подмножеством множества B , то пишут $A \not\subset B$.

Множество, не содержащее ни одного элемента, называется пустым и обозначается знаком $\emptyset$. Подмножества множества, отличные от него самого и от пустого множества, называются собственными.

Руководствуясь понятием принадлежности элемента множеству и определением подмножества множества, находим, что утверждения

K – собственное подмножество множества A , $B \subset A$, $\emptyset \subset B$, $D \not\subset A$ – истинные;

$\emptyset$ – собственное подмножество множества A , $\{5, 7, 9\}$ – собственное подмножество множества D , $B \in A$, $\emptyset \in B$, $B \subset C$, $K \not\subset A$ – ложные.

2. Операции над множествами

Пример 3. Даны универсальное множество S и его подмножества A, B, C .

а) Определить множества $A \cup B$, $B \cap C$, $A \setminus C$, $\bar{B}$, если

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

$$A = \{0, 2, 4, 6, 8\}, B = \{1, 3, 5\}, C = \{0, 3, 7, 9\}.$$

б) Определить множества $(A \setminus B) \cup C$, $\bar{B} \cap \bar{C}$, если

$$S = \{x \in R \mid 0 < x \leq 12\}, A = \{x \in R \mid 2 \leq x < 6\},$$

$$B = \{x \in R \mid 3 < x < 10\}, C = \{x \in R \mid 0 < x \leq 2\},$$

где R – множество действительных чисел.

Решение. Объединением (суммой) множеств A и B называется множество

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\}.$$

Пересечением (произведением) множеств A и B называется множество

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}.$$

Разностью множеств A и B называется множество

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}.$$


Дополнением множества A называется множество $\overline{A} = S \setminus A$, где S – универсальное множество.

а) По определениям имеем

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}, \quad A \cap B = \{3\},$$

$$A \setminus B = \{2, 4, 6, 8\}, \quad \overline{B} = \{0, 2, 4, 6, 7, 8, 9\}.$$

б) По определениям последовательно находим (см. рис. 1)






Рис. 1.

$$A \setminus B = \{x \in R \mid 2 \leq x \leq 3\},$$

$$(A \setminus B) \cup C = \{x \in R \mid 0 < x \leq 3\},$$

$$\overline{B} = \{x \in R \mid 0 < x \leq 3, 10 \leq x \leq 12\},$$

$$\overline{C} = \{x \in R \mid 2 < x \leq 12\},$$

$$\overline{B} \cap \overline{C} = \{x \in R \mid 2 < x \leq 3, 10 \leq x \leq 12\}.$$

3. Декартово произведение множеств

Пример 4. Определить элементы

а) декартова произведения $A \times B$, если

$$A = \{4, 7, 8\}, \quad B = \{a, b, c, d\};$$

б) множества $(A \cap B) \times C$, если

$$A = \{10, 15, 20, 99, 100, 170\}, \quad B = \{0, 1, 15, 45, 99, 115, 170\}, \\ C = \{\alpha, \beta\}.$$

Решение. Декартовым (прямым) произведением множеств A и B называется множество

$$A \times B = \{x = (a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Множество

$$A^2 = A \times A = \{x = (a, b) \mid a \in A, b \in A\}$$

называется декартовым квадратом.

а) По определению имеем

$$A \times B = \{(4, a), (4, b), (4, c), (4, d), (7, a), (7, b), (7, c), (7, d), \\ (8, a), (8, b), (8, c), (8, d)\}.$$

б) По определению находим

$$A \cap B = \{15, 99, 170\},$$

$$(A \cap B) \times C = \{(15, \alpha), (15, \beta), (99, \alpha), (99, \beta), (170, \alpha), (170, \beta)\}.$$

Задачи для самостоятельного решения

1. Записать множество натуральных чисел, делящихся без остатка на 3 и не превышающих 40, путем перечисления и описания его элементов.

2. Указать все подмножества множества $\{a, b, c\}$.

3. Даны множества

$$A = \{x \in R \mid -5 \leq x < 1\}, \quad B = \{x \in R \mid -5 < x \leq 0\},$$

$$C = \{x \in R \mid -2 \leq x \leq 1/2\}, \quad D = \{x \in R \mid 0 < x < 1\}.$$

Указать среди следующих утверждений истинные и ложные:

$$C \subset D, \quad C \not\subset D, \quad \emptyset \in A, \quad C \subset A, \quad B \in A, \quad \emptyset \subset B, \quad 2 \in D, \quad -2 \in B,$$

$\emptyset$ – собственное подмножество множества B , B – собственное подмножество множества A .

4. Из каких элементов состоят множества $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, если $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$?

5. Определить множества $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $\bar{A}$, $\bar{B}$, если $A = \{x \in R \mid x > 1\}$, $B = \{x \in R \mid x < 2\}$.

6. Даны универсальное множество S и его подмножества A , B , C . Определить множества $A \cup B$, $B \cap C$, $A \setminus C$, $\bar{B}$, $(A \cup C) \cap B$, $\overline{(\bar{A} \setminus B) \cup C}$, $(A \cap \bar{C}) \setminus B$, если

$$1) S = \{x \in R \mid 0 \leq x \leq 10\}, \quad A = \{x \in R \mid 1 < x < 7\},$$

$$B = \{x \in R \mid 2 \leq x < 8\}, \quad C = \{x \in R \mid 7 < x \leq 9\};$$

$$2) S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad A = \{1, 2, 3, 4\},$$

$$B = \{1, 3, 5\}, \quad C = \{4, 6\}.$$

7. Определить множества $A \times B$, $B \times A$, A^2 , B^2 , если
 $A = \{1, 2\}, \quad B = \{2, 3\}.$